

# SE FAIRE TESTER : QUAND, COMMENT, OÙ ?



## VOUS AVEZ DES SYMPTÔMES?



RHUME



MAL DE TÊTE



FIÈVRE



PERTE DU GOÛT  
OU DE L'ODORAT



COURBATURES



DIFFICULTÉS  
RESPIRATOIRES



FATIGUE



DIARRHÉE

Allez en isolement et évaluez vos symptômes à l'aide de l'outil d'auto-évaluation sur [www.masanté.be](http://www.masanté.be) plutôt que de contacter votre médecin\*

### UN TEST N'EST PAS NÉCESSAIRE

L'isolement peut être levé.

### UN TEST EST NÉCESSAIRE

Restez en isolement et demandez un code via [masanté.be](http://masanté.be) et prenez rendez-vous pour un test PCR (via [masanté.belgique.be](http://masanté.belgique.be)) ou un test rapide (via une pharmacie participante figurant sur [pharmacie.be](http://pharmacie.be)).

CONSULTEZ LE RÉSULTAT DE VOTRE TEST VIA MASANTÉ.BE, L'APPLI COVIDSAFE OU LE SMS QUE VOUS RECEVREZ.

#### NEGATIF

(vous n'êtes pas infecté.e)

L'isolement peut être levé, mais restez très prudent pendant une semaine : limitez vos contacts, évitez les personnes vulnérables, respectez les distances, continuez le télétravail et portez un masque.

#### POSITIF

(vous êtes infecté.e)

7 jours en isolement. Fin de l'isolement après 7 jours si au moins 3 jours sans fièvre et amélioration des autres symptômes. Transmettez les coordonnées de vos contacts à haut risque via [www.masante.be](http://www.masante.be). Après cela, restez encore très prudent.e pendant 3 jours : prenez encore des mesures de protection, telles que la limitation du nombre de contacts au strict nécessaire, le port permanent d'un masque (de préférence FFP2) dans une zone intérieure

\*Sauf si vous n'avez pas de téléphone portable ou de PC, si vous avez de gros doutes ou si vous êtes une personne présentant un risque plus élevé (par exemple : en cas de grossesse, de maladie cardiaque, hépatique ou pulmonaire ou pour un patient atteint d'un cancer).